



# Российские вакцины против коронавируса



Разработчик



Тип вакцины



Принцип действия



Вводится



Устойчивый иммунитет

## Спутник V («Гам-КОВИД-Вак»)



НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи

## «ЭпиВакКорона»



ГНЦ вирусологии  
и биотехнологии «Вектор»

## Вакцина НИИ им. М.П. Чумакова



Федеральный научный  
центр исследований  
и разработки  
иммунобиологических  
препаратов  
им. М.П. Чумакова РАН



Профилактическая\*



Профилактическая\*



Профилактическая\*



**На основе аденовируса  
и гена белка SARS-CoV-2.**  
Вирус доставляет  
в клетку генетический  
материал, но не может  
размножаться и вызвать  
заболевание. После  
введения организм  
начинает вырабатывать  
антитела



**На основе пептидов —  
фрагментов белка  
S SARS-CoV-2.**  
Пептиды закреплены  
на белке-носителе, который  
вместе с гидроксидом  
алюминия помогает  
усилить иммунный ответ.  
После введения в организм  
стимулирует выработку  
антител



**На основе  
инактивированного  
вируса.**  
Вместе с ним  
и вспомогательным  
веществом, гидроксидом  
алюминия, в организме  
запускается иммунный  
ответ



Двукратно, с интервалом  
в 3 недели



Двукратно, с интервалом  
в 2–3 недели



Двукратно, с интервалом  
в 2 недели



Формируется  
через 21 день после  
второй вакцинации



Формируется  
через 30 дней после  
второй вакцинации



Формируется  
на 14 день после  
второй вакцинации



**На данный момент** иммунитет подтвержден на интервале 5–7 месяцев.  
**Прогнозный иммунитет:** как минимум на год, но точные данные покажут дальнейшие  
наблюдения за привитыми и переболевшими

### Возможные побочные явления

- Кратковременное повышение температуры
- Головная боль

- Слабость
- Боль в мышцах и суставах
- Заложенность носа

- Першение в горле
- Сыпь
- Аллергические реакции



\* Не лечит, а защищает от заболевания

# Как проходит вакцинация от COVID-19



## Перед прививкой

- Осмотр врача с измерением температуры
- Сбор сведений о контактах с инфицированными
- Измерение уровня кислорода в крови и осмотр зева
- Информирование о возможных реакциях
- Заполнение информированного добровольного согласия



Для вакцинации используется  
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»)

1

## этап вакцинации

Введение компонента I  
внутримышечно

2

## этап вакцинации

Введение компонента II  
внутримышечно  
через 21 день после первой  
прививки



После прививки продолжайте носить маски. Это особенно важно в течение 42 дней после первой инъекции, пока формируется иммунитет

После прививки в течение 3 дней рекомендуется:



Не посещать  
сауну/баню



Избегать чрезмерных  
физических нагрузок



Не принимать  
алкоголь



При повышении температуры можно  
принять нестероидные  
противовоспалительные препараты



При покраснении, отечности,  
болезненности места вакцинации можно  
принять антигистаминные средства

## Запишитесь на вакцинацию через Госуслуги

<https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination>